

つらいときに病院へ行かない。

インフルエンザ常備セット

インフルエンザ抗原検査キット
(別メーカー品に変更の可能性あり)



タミフルカプセル75
(ジェネリックに変更の可能性あり)




高熱や強い倦怠感の中、外出するのはナンセンス。
症状が出てからご自宅で診察・処方・服用がワンストップ！
当院独自のサービスです。

¥ 9,900 (税込) ※自由診療

なんでタミフルを早く飲んだ方がいいの？

季節性インフルエンザ



インフルエンザウイルスは、発症後48時間でウイルス排出量がピークに達します。ウイルスが増えてしまってから服用しても効果はないため、発熱などの症状が出てから48時間以内に服用を開始する必要があります。

高熱
倦怠感

インフルエンザ!?

インフルエンザに感染した人と1週間以内に接触している場合
感染率は格段に上がります

突然の発熱や咳（せき）、のどの痛み、倦怠感（だるさ）があったり、
鼻みず、鼻づまりや頭痛などの症状があるとき
インフルエンザに感染している可能性が高いです。

自己検査
(鼻ぬぐい液)



LINEで
写真を送信




医師による
電話診察

医師の指示のもと
タミフル服用

自己検査
鼻腔ぬぐい液

お持ちの検査キットで自己検査！！
わざわざクリニックで
検査をしなくても大丈夫◎
鼻腔ぬぐい液で検査できます。

●鼻腔ぬぐい液




[鼻腔ぬぐい液の採取方法]


- 鼻腔用滅菌綿棒を外鼻孔から2cm程度挿入します。
- 綿棒を5回転させ、5秒程度静置し、検体を採取します。



LINEで
写真を送信



公式LINEにキットの写真をお送りください。
スタッフが画像を確認します！
陽性が確認できましたら、
スタッフから診察予約のご連絡をします。
【対応時間 平日9：30～16：30】






医師による
電話診察

予約時間になりましたら
医師から直接お電話いたします。
お薬のご希望も承りますのでご相談ください。



医師の指示のもと
タミフル服用



お持ちのタミフルを服用してください。
(追加のお薬は順次発送いたします。)



➡ まずはLINEを登録



日比谷国際クリニック
HIBIYA KOKUSAI CLINIC

- ※本サービスは自由診療です
- ※診察は医師の判断に基づいて行われます
- ※検査結果や症状により処方されない場合があります